

Blodmjöl

Har man problem med rådjur och harar kan blodmjölspinnar vara avskräckande. Varianten nedan står emot angrepp av vissa fåglar som gillar blodmjöl och då hackar sönder pinnarna. Den här typen av pinnar kan hålla i flera år.



Oasis skärs först till i lagom stora fyrkantiga klossar – de bör vara av samma storlek som en tulpanblomma. Använd den sortens Oasis som suger upp vätska.

Trä på klossen på en blompinne av valfri höjd – man kan använda olika längder på pinnarna, för att passa olika höjder på växter.

Klipp till en lagom stor tygbit och klä klossen med den. Naja sedan fast tygbiten på pinnen med en kraftig najtråd.


Blanda blodmjöl med vatten tills det blir en lös välling (några deciliter på en liter). Doppa ner pinnarna och låt dem ligga i blandningen tills klossen är mättad.

Pinnarna placeras sedan ut i rabatterna. Man bör helst förnya medlet, gärna en gång i veckan om man kan. Vill man dra en gräns runt trädgården kan man ta resterna från ”doppet” och droppa det längs gränsen.

Vill man ha ett starkare medel rekommenderar många att man också använder ammoniak, men det är väldigt giftigt att hantera.

Man kan få samma effekt om man pinkar i en burk och låter det stå några dagar, innan man använder det. Späd ut överskottet med vatten innan ni häller bort det.

Såpvatten



**m.fl. ekologiska
bekämpningsmedel**

Kjell Eklind

Vatten

Vanligt vatten räcker ibland för att motverka angrepp av gröna bladlöss och larver.

Skölj av växterna under rinnande kran eller spruta med en kraftig stråle från en vattenslang. Upprepa gärna behandlingen minst tre gånger med en veckas mellanrum.

Har man problem med jordloppor bör man också se till att jorden är lucker och hela tiden är fuktig. Jordlopporna är värmeälskande skalbaggar och de vill inte ha ojämn och fuktig jord.

I svåra fall kan man pudra bladen med lite aska eller trädgårdskalk.

Såpvatten

Såpvatten kan användas för att motverka angrepp av bladlöss, sköldlöss, trips, spinn och larver.

Blanda 1 – 2 msk såpa med 1 liter vatten. Den starkare dosen används för svårare angrepp av svarta bladlöss och sköldlöss. Spruta aldrig på växter som står i solen, bladen kan bli brännskadade av såpan. Upprepa behandlingen efter 4 – 5 dagar. Spruta minst vid tre tillfällen.

Vid väldigt starka angrepp kan 2 ml etanol också tillsättas per liter vatten.

OBS! Tänk på att såpa även kan skada nyttoinsekter.

För mycket behandlingar med såpa kan även skada växterna. Spola gärna av växterna med vatten efter avslutad behandling.

Grön eller gul såpa?

Såpa gjordes förr i norra Sverige på slaktrester = gul, och i södra Sverige på hampa = grön. I dag görs såpa på tallolja och blir då gul. Grön såpa har grönfärgats och ev. parfymrats.

Bikarbonat

Vanlig bikarbonat från livsmedelsaffären hjälper mot mjöldagg

Blanda 2 tsk bikarbonat med 2 tsk såpa i en liter vatten.

OBS! Spruta ej på ätliga delar eftersom det kan ge en bismak. Behandlingen upprepas vid minsta tecken på angrepp.

Mjöldaggen uppträder ofta vid torka, så se till att växterna får bra med vatten och att jorden är fuktig.

Mjölk & oljor

Mineral-, paraffin- och vegetabiliska oljor används på våren för att bekämpa kvarvarande lusägg om angreppen varit starka det föregående året.

Oljor kan även användas under säsong mot insekter och mjöldagg.

Nils Åkerstedt (Natur & Trädgård nr 2/2012) sprutar vid behov med en blandning av lätt- eller standardmjölk blandat med lika mycket vatten. För att öka vidhäftningen kan man tillsätta ett par teskedar såpa.

Spruta när bladknopparna visar sig och upprepa med 4 – 5 dagars mellanrum.

